

Muestra tu apoyo a la gente que vive con VIH.

Día mundial del SIDA

1 de diciembre

#IWEARREDBECAUSE

Alrededor del mundo



En 2018, unos **37,9 millones** de **personas vivían con HIV**.



Desde el comienzo de la epidemia, se estima que unas **32,0 millones** de personas **han fallecido por enfermedades relacionadas al SIDA**.



Se estima que **1,7 millones** de personas fueron diagnosticadas con el VIH en el 2018, **una disminución del 40% desde que los diagnósticos alcanzaron su punto máximo en 1997**.

VIH y SIDA en los Estados Unidos

- Hay más de 1,1 millones de estadounidenses que viven con el VIH.
- En el 2017, casi 40,000 personas fueron diagnosticadas con VIH.
- En el 2017, más de 17,000 personas fueron diagnosticadas con SIDA.

La epidemia del VIH afecta a algunos grupos de personas más que a otros, entre ellos a:



afroamericanos y latinos/hispanos



hombres gays y bisexuales



las personas que viven en el sur de los Estados Unidos

Hay muchos factores que contribuyen tanto al riesgo que una persona contraiga el VIH, al igual que a la salud en general. Entre estos factores se encuentran:



La educación



El acceso a la salud



Discriminación y estigma



El empleo



El apoyo familiar y comunitario



Un hogar seguro y estable

Encontrar maneras en que se les pueda garantizar servicios de salud de calidad, es importante para la salud de todas las personas.



VIH y SIDA en Luisiana



En el 2018, **21,770 personas vivían con el VIH en Luisiana.**


Más de la mitad de las personas que viven con el VIH habían sido ya **previamente diagnosticados con SIDA.**

Se estima que **1 de 5** personas que vive con el VIH en Luisiana **no están diagnosticadas y desconocen su estado de VIH.**



En el 2018 hubo **983 diagnósticos nuevos en Luisiana.** Esto representa el número más bajo de diagnósticos desde que la epidemia alcanzó su punto más alto en 1992.


Entre las personas que vivían con el VIH en el 2018:



2 de 3 eran afroamericanos



el 71% eran hombres



la mitad era menor de 45 años

Qué puede hacer usted para prevenir la transmisión del VIH:

Si vives con el síndrome del VIH, **toma tus medicamentos para el VIH** para mantenerte saludable y reducir el riesgo de pasárselo a tu pareja.



Conoce tu estado y el de tu pareja. **Hágase la prueba del VIH.**



Evita el intercambio de agujas y otros equipos de inyección.



Si eres VIH negativo, habla con tu médico sobre **la profilaxis pre-exposición (PrEP)**, una **píldora diaria** para prevenir el VIH.



Usa condones correctamente cada vez que tengas sexo oral, anal o vaginal.



Hazte la prueba y **busca tratamiento** para otras enfermedades de transmisión sexual (ETS).